


Žiedas pradeda dygti, kai dienos ilgumas siekia 14 valandų 15 min.

Maždaug kas 10 000 baltųjų dobilų lapelių turi papildomą lapelį dėl genetinės mutacijos ar aplinkos įtakos



## BALTASIS DOBILAS

Daugiametis visoje respublikoje paplitęs augalas. Šaknys plonos, ilgos, išsikerojusios. Žiedynas – ilgakotė, apvali, puri galvutė sudaryta iš 40–80 žiedelių. Kvapnūs žiedai iki 1 cm ilgio, trumpais koteliais, baigdami žydėti nusvyra žemyn. Vainikėlis baltas, kartais šviesiai rausvas, burė ilgesnė už kitus lapelius, jos viršūnė kiek įlenkta.

### Baltuosiuose dobiluose aptiktos skirtingos lapų žymės

a: No V mark (v)



b: Full V, low (Vl)



c: Broken V with yellow tip (Vby)



d: Marginal mark (Vm)



e: Redspot (Vr2)



f: Red leaflet (Vr1)



g: Red midrib (Rm)





h: Red leaf (Rl)




i: Red fleck (Rf)



# Raudonojo dobilo augimo ciklas



Sausros poveikis  
raudonajam  
dobilui



**Raudonasis dobilas (*Trifolium pratense* L.)**  
Lapai trilapiai su plėveliniais prielapiais. Vienas būdingų požymių - ant lapų v formos balta dėmė. Žiedai rožiniai. Žiedyne 20-80 žiedų. Žiedus apdulkina kamanės. Žiedynai ir lapai gali būti vartojami maistui (sriuboms), valgams papuošti, žiemai džiovinami arba marinuojami.

